

V2009 - OPPG. 4

EMILIE ARENTZ-HANSEN

Jeg tror tanken er at du ønsker å finne en ringhomomorfi $\phi : \mathbb{Z}_p[x] \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_p)$ slik at

$$\text{Im } \phi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_p \right\},$$

der $p = 3$ i b) og $p = 5$ i c). Dvs at $\text{Im } \phi = F$ i b) og $\text{Im } \phi = R$ i c). Fundamentalteoremet for ringhomomorfier gir at ringen $\text{Im } \phi$ er isomorf med $\mathbb{Z}_p[x]/\text{Ker } \phi$. Videre vet du at $\mathbb{Z}_p[x]/\text{Ker } \phi$ er en kropp hvis og bare hvis $\text{Ker } \phi$ er et maksimalt ideal i $\mathbb{Z}_p[x]$ (Teorem 27.9). Det holder derfor å finne ut om $\text{Ker } \phi$ er et maksimalt ideal eller ikke.

Men først må du altså finne en ringhomomorfi $\phi : \mathbb{Z}_p[x] \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_p)$ som tilfredsstill

$$\text{Im } \phi = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_p \right\}.$$

Hvis du fikserer en matrise $A \in M_2(\mathbb{Z}_p)$ og lar $\psi_A : \mathbb{Z}_p[x] \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_p)$ være definert av

$$\psi_A(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0I_2 + a_1A + \dots + a_nA^n$$

så gir dette en ringhomomorfi (akkurat som i V2010 oppg. 3). Man kan derfor prøve å finne en matrise A slik at $\phi = \psi_A$ tilfredsstill kravet som nevnt over. Siden

$$\psi_A(x) = A$$

så må A være på formen $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ der $a, b \in \mathbb{Z}_p$, ellers vil $\psi_A(x) \notin \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \right\}$.

Du kan selv sjekke at

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

gir oss det bildet vi ønsker (merk at dette er uavhengig av hva p er). Og siden $A^2 = -I_2$ får du at

$$\psi_A(x^2 + 1) = A^2 + I_2 = 0,$$

så $x^2 + 1 \in \text{Ker } \psi_A$. Du kan nå gjøre som i fasit og vise at $\text{Ker } \psi_A = \langle x^2 + 1 \rangle$ og bruke resultatene fra a) til å si om dette er et maksimalt ideal eller ikke (bruk teorem 27.25 som sier at $\langle x^2 + 1 \rangle$ er et maksimalt ideal hvis og bare hvis $x^2 + 1$ er et irreduktibelt polynom).