


4 VIKTIGE TEOREMER FOR TREKANTER.

Alle disse setningene er inkludert i geometri-avsnittene i $R1$ og går der under fellesbetegnelsen "Skjæringssetningene".


THEOREM A:

Halveringsstrålene for de tre vinklene i en trekant har et felles skjæringspunkt.




TEOREM B:

Midtnormalene på de tre sidene i en trekant har et felles skjæringspunkt.




TEOREM C:

De tre høydene i en trekant har et felles skjæringspunkt.



TEOREM D:

De tre medianene i en trekant har et felles skjæringspunkt.



(M, N, O er midtpunkter på de tre sidene og medianene er linjene $\overleftrightarrow{AN}, \overleftrightarrow{BO}$ og \overleftrightarrow{CM}).

BEVIS FOR TEOREM A:

Vi trenger her følgende resultat

TEOREM 4.3.6 (s. 80, VENEMA).

La P være et indre punkt i $\angle BAC$. Da ligger P på vinkelhalveringsstrålen til denne vinkelen hvis og bare hvis

$$d(P, \overleftrightarrow{AB}) = d(P, \overleftrightarrow{AC}).$$

Vi beviser først at to vinkelhalveringsstråler skjærer hverandre. Siden vinkelhalveringsstråler er indre stråler, følger det fra Crossbar-teoremet at vinkelhalveringsstrålen til $\angle BAC$ skjærer BC i et punkt D s.a. $B * D * C$. Likeledes vil vinkelhalveringsstrålen til $\angle ABC$ skjære AC i et punkt E . Crossbar-teoremet anvendt på $\triangle ABE$ gir da at \overleftrightarrow{AD} skjærer \overleftrightarrow{BE} i et punkt S s.a. $B * S * E$. Altså har vi:

$$\overline{AD} \cap \overline{BE} = \{S\}.$$


Ut fra "bare hvis" i teorem 4.3.6 følger:

$$d(S, \overleftrightarrow{AB}) = d(S, \overleftrightarrow{AC}) \text{ og } d(S, \overleftrightarrow{BC}) = d(S, \overleftrightarrow{AB})$$

Dette gir: $d(S, \overleftrightarrow{AC}) = d(S, \overleftrightarrow{BC})$. Fra "hvis" i Teorem 4.3.6 har vi derfor at S ligger på vinkelhalveringsstrålen til $\angle BCA$. \square

KOROLLAR:

En sirkel med sentrum i S og radius $r = d(S, \overleftrightarrow{AB}) = d(S, \overleftrightarrow{BC}) = d(S, \overleftrightarrow{CA})$ vil berøre (tangere) de tre sidene i trekanten $\triangle ABC$. (Denne sirkel betegnes gjerne som den innskrevne sirkel til trekanten.)



BEVIS FOR TEOREM B:


Vi minner her om

TEOREM 4.3.7 (s. 80, VENEMA)

Hvis $A \neq B$ vil punktet P ligge på midtnormalen av \overline{AB} hvis og bare hvis $PA = PB$.

Vi påstår først at de to midtnormalene l og m på figuren skjærer hverandre i et punkt S .

Dersom $l \parallel m$, følger fra Teorem 5.1.7 (VENEMA, s. 108) at $\overleftrightarrow{AB} = \overleftrightarrow{BC}$ eller $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{BC}$. Men dette er i strid med definisjonen av en trekant. Ut fra "bare hvis" i ovenstående teorem har vi:



$$SA = SB \text{ og } SB = SC$$

og følgelig må $SA = SC$. Ut fra "hvis" følger det da at S ligger på midtnormalen for \overline{CA} . \square

KOROLLAR:

En sirkel med sentrum i S og radius


$$r = SA = SB = SC$$

vil gå gjennom de tre hjørnene i $\triangle ABC$. (Denne sirkel kalles den omskrevne sirkel til trekanten.)

BEVIS FOR TEOREM C

Her trekker vi tre linjer gjennom de tre hjørnene parallelle med motstående side i trekanten. Siden disse linjene ikke kan være parallelle (igjen ut fra Teorem 5.1.7), får vi en ny trekant: $\triangle A'B'C'$. Vi påstår

nå at høyden \overleftrightarrow{CF} er midtnormal på siden $\overline{B'C'}$ i den store trekanten. At




$\overleftrightarrow{CF} \perp \overleftrightarrow{B'C'}$ er klart ut fra det faktum at $\overleftrightarrow{CF} \perp \overleftrightarrow{AB}$ og $\overleftrightarrow{AB} \parallel \overleftrightarrow{BC}$. (Teorem 5.1.6, s. 108). Videre innsees at $CC' = CB'$ siden $C'C = AB$ og $AB = CB'$ ut fra egenskaper ved parallellogramer; (Teorem 5.1.10(2), s. 108). Analogt bevises at $C'A = AA'$ og $A'B = BB'$. Siden midtnormalene på sidene i $\Delta A'B'C'$ har et felles skjæringspunkt i følge Teorem B er påstanden bevist. \square

BEVIS FOR TEOREM D:

Siden D er midtpunktet på \overline{BC} vil $B * D * C$, og følgelig er \overrightarrow{AD} en indre stråle i $\angle BAC$.

Siden $C \in \overrightarrow{AC}$ og $F \in \overrightarrow{AB}$, må \overrightarrow{AD} skjære \overline{FC} i et indre punkt G i følge Crossbar-teoremet.

(Teorem 3.5.2, s. 56). Vi trekker så en linje l gjennom E og en linje n gjennom F s.a. $l \parallel m$ og $n \parallel m$, $m = \overleftrightarrow{AD}$. Ut fra MAIVT (Teorem 4.7.1) blir



$$\Delta CEH \sim \Delta CAD \text{ og } \Delta FBI \sim \Delta ABD.$$

Fundamentalteoremet for formlike trekanter (TEOREM 5.3.1, s. 112) gir da:

$$\frac{CD}{CH} = \frac{CA}{CE} = 2, \quad \frac{BD}{BI} = \frac{BA}{BF} = 2$$

Altså er: $CH = HD = DI = IB$. Siden $l \parallel m$ og $m \parallel n$ følger ved et tilsvarende argument at $CG = 2GF$. Altså deles medianen \overline{CF} av den andre medianen \overline{AD} i forholdet 2:1. Men det samme resultat oppnås om vi studerer skjæringen mellom medianene \overline{CF} og \overline{BE} . Altså må G være felles skjæringspunkt for de tre medianene i ΔABC . De deler dessuten hverandre i forholdet 2:1. \square

GJELDER TEOREMENE OVENFOR I NØYTRAL GEOMETRI ELLER BARE I EUKLIDSK GEOMETRI?

TEOREM A:

I dette beviset benyttes Teorem 3.5.2 og Teorem 4.3.6 som begge er gyldige innenfor nøytral geometri. Altså er dette et resultat innenfor nøytral geometri.

TEOREM B:

Her benyttes Teorem 5.1.7 som er et resultat innenfor euklidsk geometri. I og for seg utelukker ikke dette at vårt teorem var et resultat som kunne bevises uten å trekke inn Teorem 5.1.7, og da kanskje var et teorem innenfor nøytral geometri. Men vi skal senere i kurset gi et eksempel innenfor hyperbolsk geometri der to midtnormaler ikke skjærer hverandre. Altså er dette et teorem som ikke holder i nøytral geometri.

TEOREMENE C og D.

I tillegg til at Teorem *C* bygger på Teorem *B* og dessuten bygger på Teorem 5.1.7 synes det klart at dette er et resultat innenfor euklidsk geometri. Teorem *D* bygger også i sterk grad på euklidsk geometri.

MA 2401 - GEOMETRI

VÅR 2013

Freitag 5/4 - kl. 12¹⁵-14

21. forelesning.

HVA GJORDE VI SIST?

- Oppgave #9, s. 104.
- Teorem 4.8.12 (Aristoteles' teorem. Bevis: neste øving.)

4.9 DET UNIVERSELLE HYPERBOLSKE TEOREM.

- Teorem 4.9.1 (Det universelle hyperbolske teorem.)
- Korollarene 4.9.2/4.9.3

KAP 5. EUKLIDSK GEOMETRI

5.1 GRUNNLEGGENDE TEOREMER I EUKLIDSK GEOMETRI.

- Teoremene 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9.
- Teorem 5.1.10 (Egenskaper ved euklidiske parallelogram.)

5.2 PARALLELL-PROJEKSJONS-TEOREMET.

- Teorem 5.2.1 (Parallell-projeksjons-teoremet.)
- Lemma 5.2.2 / Bevis for Teorem 5.2.1.

DAGENS PROGRAM:

5.3 FORMLIKE TREKANTER.

- Teorem 5.3.1 (Fundamental-teoremet for formlike trekanter.)
(FTFT)
- Korollarene 5.3.2/5.3.3
- Teorem 5.3.4 (Det omvendte av FTFT.)

5.4 PYTAGORAS' TEOREM.

- Teorem 5.4.1 (Pytagoras' teorem.)
- Definisjon 5.4.2 (Geometriske middel.)
- Teorem 5.4.3/5.4.4 (Rettvinklede trekanter.)
- Teorem 5.4.4 (Det motsatte av Pytagoras' teorem.)

MA 2401 - GEOMETRI

VÅR 2013

Onsdag 3/4 - kl. 8¹⁵-10

20. forelesning.

HVA GJORDE VI SIST?

- Teorem 4.8.4 (6 ekvivalente utsagn om defekt.)
- Korollar 4.8.5 (Defekt av trekant.)
- Lemma 4.8.6 / Bevis for Teorem 4.8.4.
- Clairauts aksiom. (Det eksisterer et rektangel.)
- Korollar 4.8.7 (Clairauts aksiom \Leftrightarrow EPP.)
- Definisjon 4.8.8 (Saccheri-kradriateral.)
- Definisjon 4.8.9 (Lambert-kradriateral.)
- Teorem 4.8.10 (Egenskaper for Saccheri-kradriateraler.)
- Teorem 4.8.11 (Egenskaper for Lambert-kradriateraler.)

DAGENS PROGRAM:

- Oppgave # 9, s. 104
- Teorem 4.8.12 (Aristoteles' teorem; (Bevis i øving 6))

4.9 DET UNIVERSELLE HYPERBOLSKE TEOREM.

- Teorem 4.9.1 (Det universelle hyperbolske teorem.)
- Korollarene 4.9.2 / 4.9.3

KAP 5. EUKLIDSK GEOMETRI.

5.1 GRUNNLEGGENDE TEOREMER I EUKLIDSK GEOMETRI.

- Teoremene 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
5.1.7, 5.1.8, 5.1.9.
- Teorem 5.1.10 (Egenskaper ved euklidske parallellogram.)

5.2 PARALLELL-PROJEKSJONS-TEOREMET.

- Teorem 5.2.1 (Parallell-projeksjons-teorem.)
- Lemma 5.2.2 / Bevis for Teorem 5.2.1.