

## Uke 3, forelesning 1


Wednesday, 9 January 2019 13:35

### Å skrive bevis

Et bevis er en rekke logiske argument som starter med en hypotese og avslutter med en konklusjon.

Hvert steg må begrunnes med

- hypotesen
- aksiomene
- tidligere teorem
- definisjonene
- tidligere steg
- regler i logikk

Bevis. 



Direkte bevis:

hypotese  $\rightarrow$  konklusjon  
 $P$   $Q$

Indirekte bevis:

Vil utelukke at  $P$  er sann samtidig som  $Q$  er usann.

Antar  $P$  sann og  $Q$  usann

viser at man får en motsigelse.

Merk at et direkte bevis av det kontrapositive ikke er det samme.  
 Består av ikke  $Q \Rightarrow$  ikke  $P$ .

---

IA 1 For ethvert par av distinkte punkter  $P$  og  $Q$ , så eksisterer det en unik linje  $l$  slik at både  $P$  og  $Q$  ligger på  $l$ .

IA 2 For enhver linje  $l$  finnes det minst to distinkte punkt  $P$  og  $Q$  slik at  $P$  og  $Q$  ligger på  $l$ .

IA 3 Det finnes tre punkt som er ikke-kollinear.

Definisjon: To linjer skjærer hverandre dersom det eksisterer et punkt som ligger på begge linjene.

Definisjon: To linjer  $l$  og  $m$  er parallell dersom det ikke eksisterer et punkt  $P$  slik at  $P$  ligger både på  $l$  og  $m$ .

Teorem 2.6.2 Linjer som ikke er parallell skjærer hverandre i ett punkt.

Omformulering: Dersom  $l$  og  $m$  er to ikke-parallele linjer, så eksisterer det et unikt punkt  $P$  slik at  $P$  ligger både på  $m$  og  $l$ .

Bevis. La  $l$  og  $m$  være to linjer slik at  $l \neq m$  og  $l \nparallel m$ . Skal vise at:

1. Det finnes et punkt  $P$  som ligger både på  $m$  og  $l$ .
2. Det finnes kun et slikt punkt.

1. Ved negasjon av definisjonen av Parallele linjer, så vet man at det eksisterer et punkt  $P$  slik at  $P$  ligger både på  $l$  og  $m$ .

2. Anta at det eksisterer et punkt  $Q$ , som ikke er  $P$ , slik at  $Q$  også ligger på  $l$  og  $m$ .

(RAA). Da er linjen  $l$  den unike linjen slik at  $P$  og  $Q$  ligger på  $l$  (IA1), og linjen  $m$  er også den unike linjen

Forst, hva gir hypotesen deg?

Hva trenger du å vise?

(For å rydde i tankene og forklare leseren hva man skal gjøre.)

Direkte bevis

Indirekte bevis (RAA)

slik at  $P$  og  $Q$  ligger)  
 på  $m$ . Så  $l = m$   
 (unikhet). Men dette  
 motsier hypotesen om  
 at  $l$  og  $m$  er to ulike  
 linjer. Derfor må antagelsen  
 forkastes, og konklusjonen  
 er at det ikke finnes et  
 slik punkt  $Q$ .

## Kapittel 3 Aksiomer for plangeometri

3.1

Udefinerte begrep:

- punkt
- linje
- avstand
- halv-plan
- vinkel mål

Aksiom 3.1.1 (NG1) Eksistenspostulater  
 Samlingen av alle punkt er en  
 ikke-tom mengde. Det er mer enn  
 et punkt i den mengden.

Definisjon 3.1.2

Mengden av alle punkt kalles planet.  
 Notasjon:  $\mathbb{P}$

Aksiom 3.1.3 (NG2) Insidenspostulater  
 Enhver linje er en mengde bestående

er punkter. For ethvert par av punkter  $A$  og  $B$ , så finnes det akkurat en linje  $l$  slik at  $A \in l$  og  $B \in l$ .

Notasjon linje:  $\overleftrightarrow{AB}$

Definisjon av "å ligge på" / "være insident"  
Et punkt  $P$  ligger på  $l$  dersom  $P \in l$ . med 4:

Definisjon av eksternt punkt:

$P$  er et eksternt punkt til linjen  $l$  dersom  $P$  ikke ligger på  $l$ .

Definisjon av to parallelle linjer:

To linjer  $m$  og  $l$  er parallelle,  $l \parallel m$ , dersom det eksisterer et punkt  $P$  som ligger både på  $m$  og  $l$ .

$(l \cap m = \emptyset)$

Teorem 3.1.7 Hvis  $l$  og  $m$  er to ulike, ikke-parallele linjer, så eksisterer det ett punkt  $P$  slik ligger både på  $l$  og  $m$ .

Bevis: Beviset er det samme som i insidensgeometri. Bruk N62.

Har enten  $l=m$ ,  $l \parallel m$  eller

$$l \cap m = \{P\}.$$

3.2 Avstand og linjelpostulatet  
Hvordan antar vi om avstand?

Aksiom 3.2.1 (NG3) For et hvert par av punkter  $P$  og  $Q$ , så eksisterer det et reelt tall  $PQ$ , kalt avstanden fra  $P$  til  $Q$ .

For enhver linje  $l$  så er det en en-til-en korrespondanse fra  $l$  til  $\mathbb{R}$  slik at dersom  $P$  og  $Q$  er punkter på  $l$  som korresponderer med reelle tall  $x$  og  $y$ , respektivt, så vil  $PQ = |x - y|$ .

Fem definisjoner  $\overset{\circ}{A}, \overset{\circ}{B}, \overset{\circ}{C}$

3.2.2 Tre punkter  $\overset{\circ}{A}, \overset{\circ}{B}, \overset{\circ}{C}$  er kollinear dersom det eksisterer en linje  $l$  slik at  $A, B, C \in l$ .

3.2.3 La  $A, B$  og  $C$  være tre ulike punkter. Punktet  $C$  er mellom  $A$  og  $B$  dersom  $A, B$  og  $C$  er kollinear og  $AC + CB = AB$ .

Notasjon:  $A * C * B$

2.11 linjesegment


3.2.4 Linjestykker

Et linjestykke,  $\overline{AB}$ , er defineret som

$$\overline{AB} = \{A, B\} \cup \{P \mid A * P * B\}.$$

En stråle,  $\overrightarrow{AB}$ , er defineret som

$$\overrightarrow{AB} = \overline{AB} \cup \{P \mid A * B * P\}$$



3.2.5 Længden af segmentet  $\overline{AB}$  er  $AB$  (afstanden fra  $A$  til  $B$ ).

To segmenter  $\overline{AB}$  og  $\overline{CD}$  er kongruente ( $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ ) dersom de er lige lange.

3.2.6.  $A$  og  $B$  kaldes endepunkterne til  $\overline{AB}$ , og alle andre punkt mellem  $A$  og