

ForNotat M1 kap 6.1 del 1

Hvor er vi i pensum?

- Se pdf
- Hva handler kap 6 om?

Integration by parts

- Delvis integrasjon

- Hvorfor?

- Mål:

- Kjenne igjen når man bruker Int. by parts
- Kunne utføre Int. by parts

Formel

$$\int u \cdot v' = uv - \int u'v$$

ex: formelen stemmer

$$u = x, v = x^2, u' = 1, v' = 2x$$

$$V.S. = \int x \cdot 2x = \int 2x^2 = \frac{2}{3}x^3$$

$$H.S. = x \cdot x^2 - \int 1 \cdot x^2 = x^3 - \int x^2 = x^3 - \frac{1}{3}x^3 = \frac{2}{3}x^3$$

$$V.S. = H.S.$$

ForNotat M1 kap 6.1 del 2

EXH. 6.1

Finne  $\int x e^{\sqrt{x}}$

Oppg 6.1.14

Løsning

⋮

⋮  
-

⋮  
-

⋮  
-

⋮

For Notat kap 6.1 del 3

Generell formulering

$$\frac{d}{dx} u \cdot v = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\int (uv)' = \int u'v + \int uv' = uv$$

$$\int uv' = uv - \int u'v$$

I boka

Skrivemåte 2:

$$\int u \frac{dv}{dx} dx = uv - \int \frac{du}{dx} v dx$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Med integrasjonsgrenser

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \sin^{-1}(x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} 1 \cdot \sin^{-1}(x) dx = \left[ x \sin^{-1}(x) \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) - 0 \cdot 0 + \left[ \sqrt{1-x^2} \right]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\pi}{6} + \sqrt{1-\frac{1}{4}} - \sqrt{1-0} = \frac{\pi}{12} - 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

# FORNotat M1 kap 6.2 del 1

## Partial fractions

· kap 6.2 del 2

· Mål

TA polynombrøker  $\frac{P}{Q}$  med  $\deg P < \deg Q$   
og skrive som en sum av mindre  
kompliserte brøker

· Hvorfor?

⋮

Eksempel (enkelt)

Skriv  $\frac{1}{x^2-1}$  som  $\frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{x-1}$

Note  
 $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{(x+1)(x-1)}$

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2}{x-1}$$

$$\left| \cdot (x^2-1) \right.$$

$$\frac{x^2-1}{x^2-1} = \frac{A_1(x+1)(x-1)}{x+1} + \frac{A_2(x+1)(x-1)}{x-1}$$

$$1 = A_1(x-1) + A_2(x+1)$$

$$1 = A_1x - A_1 + A_2x + A_2$$

$$1 = (A_1 + A_2)x + (-A_1 + A_2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ -A_1 + A_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -A_2 \\ +A_2 + A_2 = 1 \\ A_2 = \frac{1}{2} \\ A_1 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

FOR Notat M1 kap 6.2 del 2

Altså

$$\frac{1}{x^2-1} \equiv \frac{-1/2}{x+1} + \frac{1/2}{x-1}$$

Generell metode for  $\frac{P}{Q}$

i) Sørg for at  $\deg P < \deg Q$

ii) Faktoriser  $Q$  til lineære & 2. grads

iii) Skriv  $\frac{P}{Q} \equiv \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{E}{(x-a)^2} + \dots$

iv) Gjør triksete ting for å finne  
likninger for  $A, B, C, D, \dots$

v) Løs likningene

vi) Skriv opp resultatet  $\frac{P}{Q} = \dots$  og sjekk  
at det stemmer ved å legge sammen  
brøkene

vii) Spis en sjokolade.

FOR Notat M1 kap 6.2 del 3

Vanskelig eksempel

Use partial fractions on

$$\frac{1}{x^4 - 3x^3}$$

Relatert oppg

6.2.25: Integrer denne

Løsning

$$\frac{1}{x^3(x-3)} \equiv \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2} + \frac{D}{x^3}$$

Trenger likninger:

•  $(x-3)$  sett inn  $x=3$

$$\frac{1 \cdot (x-3)}{x^3 \cdot (x-3)} = \frac{A(x-3)}{x-3} + \frac{B(x-3)}{x} + \frac{C(x-3)}{x^2} + \frac{D(x-3)}{x^3}$$

$$x=3 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{3^3} = A + 0 + 0 + 0 = A$$

Ny likning:

•  $(x^3)$  sett inn  $x=0$

$$\frac{1}{0-3} = 0 + 0 + 0 + D \Rightarrow D = -\frac{1}{3}$$

Den store likningen:

$$1 \equiv Ax^3 + Bx^2(x-3) + Cx(x-3) + D(x-3)$$

$$1 \equiv x^3(A+B) + x^2(-3B+C) + x(-3C+D) - 3D$$

Hvor mange?

Egentlig  
lim  
 $x \rightarrow 3$

Grang med  
 $x^3(x-3)$

FÖRNOTM 1 kap 6.2 del 4

Detta ger

$$A + B = 0$$

$$-3B + C = 0$$

$$-3C + D = 0$$

$$-3D = 1$$

Fra triks

$$A = \frac{1}{27}$$

$$D = -\frac{1}{3}$$

Så:  $B = -\frac{1}{27}$ ,  $C = 3B = -\frac{1}{9}$ ,  $D = -\frac{1}{3}$ ,  $A = \frac{1}{27}$

Altså

$$\frac{1}{x^3(x-3)} \equiv \frac{\frac{1}{27}}{x-3} - \frac{\frac{1}{27}}{x} - \frac{\frac{1}{9}}{x^2} - \frac{\frac{1}{3}}{x^3}$$

Merk!

$$\frac{1}{x^3(x-3)} \equiv \frac{\frac{1}{27}}{x-3} - \frac{\frac{1}{27}x^2 + \frac{1}{9}x + \frac{1}{3}}{x^3}$$

Integrer en brøk

$$I = \int \frac{P(x)}{Q(x)} \quad \boxed{\text{polynom}} = \int \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - 1}$$

$$= \int \frac{P_2(x)}{Q(x)} + R(x) \quad \boxed{\text{deg } P_2 < \text{deg } Q} = \int \frac{1}{x^2 - 1} + x$$

$$= \int \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \dots + R(x) = \int \frac{-1/2}{x+1} + \frac{1/2}{x-1} + x$$

Sum av disse

$$\left\{ \begin{aligned} \int \frac{x}{x^2+a^2} &= \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2) + C \\ \int \frac{1}{x^2+a^2} &= \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + C \\ \int \frac{1}{x-a} &= \ln|x-a| + C \quad \begin{matrix} a \geq 0 \\ a < 0 \end{matrix} \\ \int \frac{1}{(x-a)^N} &= \frac{1}{-N+1} (x-a)^{-N+1} \quad N \geq 2 \end{aligned} \right.$$




Inverse Substitutions

- Vinkelsubstitusjoner
- Mål

Kjenne igjen & Utføre "Inverse Substitutions"


Enkelt Eksempel

Finn  $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$



Løsning:

"Hmm, ser ut som sirkel, derivert av arcsin/cos/tan"



$$\sin \theta = \sqrt{1-x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \sin \theta = \frac{d}{dx} \sqrt{1-x^2}$$

$$\cos \theta \cdot \frac{d\theta}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x)$$

$$\cos \theta \cdot \frac{d\theta}{dx} = \frac{-x}{\sin \theta} = \frac{-\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{-1}{\sin \theta} \Rightarrow dx = -\sin \theta d\theta$$

$$I = \int_{x=0}^{x=1} \sin \theta \cdot (-\sin \theta) d\theta$$

$$\boxed{\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}}$$

$$I = -\frac{1}{2} \int_{x=0}^1 (1 - \cos 2\theta) d\theta = -\frac{1}{2} \left[ \theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{x=0}^1$$

$$I = -\frac{1}{2} \left[ \arccos x - \frac{1}{2} \sin(2 \arccos(x)) \right]_0^1$$

FORNOTM1  
Kap 6.3 del 2

$$= -\frac{1}{2} \left( 0 - \frac{1}{2} \sin(2 \cdot 0) \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin(2 \cdot \frac{\pi}{2}) \right)$$

$$= 0 + \frac{\pi}{4} - 0$$

$$\underline{\underline{\frac{\pi}{4}}}$$

### Generell diskusjon

- Må tegne!  
- bruk tegningen hele tiden
- Må kunne/finne  $\sin^N \theta$  etc formler
- Kan være vanskelig å se om det vil funke  
- Som andre teknikker

### Vanskelig eksempel

EX Oppgave 6.3.10

$$\text{Finne } \int \frac{\sqrt{9+x^2}}{x^4} dx$$

! (Ta nytt ark)

## Kap 6.4 Other Methods

FAV M1 Kap 6.4

- Mål

- Ingen

- Gjette m/ubest. koeff

"  $\int x e^x$  var  $ax e^x + be^x$  for noen tall  $a, b$ .

- Maple etc.

- Numerikk  $\rightarrow$  kap 6.6 + 6.7

Improper integrals

- Vekte integraler

- Mål

Kunne gi mening til flere typer  
integraler

- Hvorfor?

⋮

Enkelt eksempel

Finne  $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$

Løsning

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx \quad \text{stykkevis kontinuerlig}$$

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx + \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

Kontinuerlig, men ikke på intervallet  $[0, 1]$

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2 \int_{\varepsilon}^1 \frac{1}{x^2} dx \quad \text{kontinuerlig!!}$$

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2 \left[ \frac{-1}{x} \right]_{\varepsilon}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2 \cdot \left( -1 + \frac{1}{\varepsilon} \right)$$

$$= 2 \lim_{w \rightarrow \infty} (-1 + w) = 2 \cdot \infty = \underline{\underline{\infty}}$$

Generelt

Hvis ting går mot  $\infty$ , bytt ut med grenseverdier

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx$$

Hva kan gå galt?

Ikke konvergens:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \sin \theta d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} \cos(R) - \cos(0) = \text{ikke def.}$$

Tosidig galenskap

$$\int_{-\infty}^{\infty} x dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R x dx + \lim_{S \rightarrow \infty} \int_{-S}^0 x dx$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} R^2 + \lim_{S \rightarrow \infty} (0 - S^2)$$

$$= \infty - \infty$$

Kan dette fikses med  $\int_{-R}^R x dx = 0$ ?

-Nei!

Vi sier at  $\int_0^{\infty} \sin \theta$  og  $\int_{-\infty}^{\infty} x$  ikke er integrerbart.

Vanskelig eksempelEX: Prove Thm 2b  $\approx$  oppg 6.5.27

Vis at

$$\int_0^a x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{a^{1-p}}{1-p} & \text{if } p < 1 \\ \infty & \text{if } p \geq 1 \end{cases}$$

Løsning|  
|  
|