

Avstanden mellom punkter i planet. Avstanden mellom to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) i planet er $D = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Ligningen til en sirkel. Ligningen til en sirkel med sentrum (h, k) og radius $a \geq 0$ er $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$.

Annengradsligninger. Løsningene til annengradsligningen $Ax^2 + Bx + C = 0$ der A, B , og C er konstanter og $A \neq 0$, er gitt ved

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

gitt at $B^2 - 4AC \geq 0$.

Trigonometriske identiteter. Hvis s og t er reelle tall, så gjelder:

$$\begin{array}{ll} (1) \cos(s+t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t & (3) \cos(s-t) = \cos s \cos t + \sin s \sin t \\ (2) \sin(s+t) = \sin s \cos t + \cos s \sin t & (4) \sin(s-t) = \sin s \cos t - \cos s \sin t \end{array}$$

Tangentlinjer. Hvis f er en funksjon som er deriverbar i et punkt x_0 , så er ligningen for tangentlinjen til $y = f(x)$ gitt ved $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Regneregler for derivasjon. Hvis f og g er deriverbare i x , så gjelder:

$$\begin{array}{l} (1) (fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ (2) (f/g)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \quad (\text{gitt at } g(x) \neq 0) \end{array}$$

Kjerneregelen. Hvis g er deriverbar i x og f er deriverbar i $g(x)$, så er

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x).$$

Derivasjon av trigonometriske funksjoner.

$$\begin{array}{ll} (1) \frac{d}{dx} \sin x = \cos x & (2) \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \\ (3) \frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \end{array}$$

Sekantsetningen (middelverditeoremet). Hvis en funksjon f er kontinuerlig på intervallet $[a, b]$ og deriverbar på intervallet (a, b) , så eksisterer $c \in (a, b)$ slik at $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$.

Inverse trigonometriske funksjoner.

$$\begin{array}{l} (1) \arcsin(\sin x) = x \text{ for } x \in [-\pi/2, \pi/2]. \\ (2) \sin(\arcsin x) = x \text{ for } x \in [-1, 1]. \\ (3) \arccos(\cos x) = x \text{ for } x \in [0, \pi]. \\ (4) \cos(\arccos x) = x \text{ for } x \in [-1, 1]. \\ (5) \arctan(\tan x) = x \text{ for } x \in (-\pi/2, \pi/2). \\ (6) \tan(\arctan x) = x \text{ for alle } x. \end{array}$$

Derivasjon av inverse trigonometriske funksjoner.

$$\begin{array}{ll} (1) \frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (2) \frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2} \end{array}$$

Hyperbolske funksjoner.

$$\begin{array}{ll} (1) \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} & (2) \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ (3) \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \end{array}$$

Derivasjon av hyperboliske funksjoner.

$$(1) \frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x \quad (2) \frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$$

Newtons metode. $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

Taylorpolynom. Taylorpolynomet til f av grad n om punktet a er polynomet

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Hvis $E_n(x) = f(x) - P_n(x)$, så er $E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(s)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ for en s mellom a og x .

Noen elementære integraler.

$$(1) \int x^r dx = \frac{1}{r+1} x^{r+1} + C \text{ for } r \neq -1$$

$$(2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$(3) \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(4) \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$(5) \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$(6) \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin(x/a) + C \text{ for } a > 0$$

$$(7) \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan(x/a) + C$$

Delvis integrasjon.

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

Trapesmetoden. La $h = (b-a)/n$, $y_i = f(x_i) = f(a + ih)$ for $i = 0, 1, \dots, n$. Da er

$$\int_a^b f(x) dx \approx T_n = h \left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n \right)$$

og for f to ganger deriverbar, hvor $|f''(x)| \leq K$ for alle $x \in [a, b]$,

$$\left| \int_a^b f(x) dx - T_n \right| \leq \frac{K(b-a)}{12} h^2 = \frac{K(b-a)^3}{12n^2}.$$

Simpsons metode. La $h = (b-a)/2n$, $y_i = f(x_i) = f(a + ih)$ for $i = 0, 1, \dots, 2n$. Da er

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_{2n} = \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

og for f fire ganger deriverbar, hvor $|f^{(4)}(x)| \leq K$ for alle $x \in [a, b]$,

$$\left| \int_a^b f(x) dx - S_{2n} \right| \leq \frac{K(b-a)}{180} h^4 = \frac{K(b-a)^5}{180(2n)^4}.$$

Eulers metode. $x_{n+1} = x_n + h$, $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$.