

## Interaktiv forelesning uke 13

Våren 2020

## Læringsoppgaver

1] La  $T$  være det lukkede området i  $\mathbb{R}^3$  som ligger mellom de to halvkuleflatene  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ,  $x \geq 0$  og  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ,  $x \geq 0$ . La  $\mathcal{S} = \partial T$  være overflaten til  $T$ . Gitt vektorfeltet  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, xz, 2)$ .

- a) Bestem fluksen til vektorfeltet  $\mathbf{F}(x, y, z)$  ut av flaten  $\mathcal{S}$ , dvs bestem  $\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS$ , der  $\hat{\mathbf{N}}$  er en enhetsnormalvektor som peker ut av  $\mathcal{S}$ .
- b) Bestem deretter fluksen til vektorfeltet  $\mathbf{F}(x, y, z)$  ut av det ytterste halvkuleskallet, altså  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ,  $x \geq 0$ .

2] Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad \text{for } (x, y, z) \neq (0, 0, 0).$$

Vis at  $\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = 0$  der  $\mathbf{F}(x, y, z)$  er definert.

La  $\mathcal{S}_R$  være kuleflaten med sentrum i  $(0, 0, 0)$  og radius  $R$ . Det kan vises at

$$\iint_{\mathcal{S}_R} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = 4\pi,$$

der  $\hat{\mathbf{N}}$  er enhetsnormalen som peker ut av kulen.

Forklar hva som er galt med følgende utsagn:

Bruker vi Divergensteoremet på kulen  $B_R$ , der  $\mathcal{S}_R = \partial B_R$ , så er

$$\iint_{\mathcal{S}_R} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \iiint_{B_R} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 0.$$

U] Et resultat i elektromagnetisme sier at det elektriske feltet skapt av en punktladning  $q$  plassert i  $(0, 0, 0)$  er gitt ved

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$$

der  $\epsilon_0$  er en fysisk konstant kalt vakuumets permittivitet.

Vis at

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{N}} dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

for alle lukkede flater  $\mathcal{S}$  som omslutter  $(0, 0, 0)$  og der  $\hat{\mathbf{N}}$  er enhetsnormalen til  $\mathcal{S}$  som peker vekk fra  $(0, 0, 0)$ . Dette kalles *Gauss' lov* og er den første av *Maxwells ligninger*.

## Möbius-oppgaver

- 1 La  $D$  være området i  $\mathbb{R}^3$  som er avgrenset av flatene  $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 8}$ ,  $z = 0$  og  $z = 4$ .  
Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x - z, y + x, z + 2), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Regn ut

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS,$$

der  $\mathcal{S}$  er den krumme delen av randen til  $D$  og  $\hat{\mathbf{N}}$  er enhetsnormalen til  $\mathcal{S}$  med positiv  $z$ -komponent.

- 2 Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (8x + 8x^3z, -2y(x^2 + z^2), -(12x^2z^2 + 8y^2z)), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Finn området  $T$  i  $\mathbb{R}^3$  slik at

$$\oiint_{\partial T} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$$

er størst mulig, der  $\partial T$  er randen til  $T$  og  $\hat{\mathbf{N}}$  peker ut av  $T$ .