



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

# TMA4105 Matematikk 2 — Oversiktsforelesning 2

Ole Brevig

Institutt for matematiske fag



## Nøkkelbegreper — Uke 3

- Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
  - Deriverbarhet
  - Derivasjonsregler: produktregler og kjerneregelen
- Kurver gitt ved vektorvaluert funksjon
  - Glatte kurver
  - Buelengden til kurver
  - Enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor
  - Krumning til kurver

## Teorem 11.1

La  $\mathbf{u}$  og  $\mathbf{v}$  være to deriverbare vektorvaluerte funksjoner, og la  $\lambda$  være en deriverbar skalarfunksjon. Da gjelder:

$$(a) \quad \frac{d}{dt} (\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$$

$$(b) \quad \frac{d}{dt} (\lambda(t)\mathbf{u}(t)) = \lambda'(t)\mathbf{u}(t) + \lambda(t)\mathbf{u}'(t)$$


$$(c) \quad \frac{d}{dt} (\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)$$

$$(d) \quad \frac{d}{dt} (\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t) \quad (\text{bare i } \mathbb{R}^3)$$

$$(e) \quad \frac{d}{dt} \mathbf{u}(\lambda(t)) = \mathbf{u}'(\lambda(t))\lambda'(t)$$

$$(f) \quad \frac{d}{dt} |\mathbf{u}(t)| = \frac{\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{u}'(t)}{|\mathbf{u}(t)|} \quad (\text{dersom } \mathbf{u}(t) \neq \mathbf{0})$$


U La  $\mathcal{C}$  være skjæringskurven mellom flatene  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  og  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ . Finn en parameterfremstilling for  $\mathcal{C}$ .



# OF1 — Buelengde av parametriserte kurver

La  $\mathcal{C}$  være kurven parametrisert ved


$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad a \leq t \leq b.$$



Buelengden av  $\mathcal{C}$  er gitt ved

$$s = \int_a^b \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2} dt.$$

# Buelengde




La  $\mathcal{C}$  være kurven gitt ved parametriseringen  $\mathbf{r}(t)$  der  $t \in [a, b]$ . Buelengden er

$$s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b v(t) dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt.$$

## Enhetstangent, krumning og enhetsnormal


La  $\mathbf{r}(t)$  være en glatt parametrisering med  $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$  og  $v(t) = |\mathbf{v}(t)|$ . Da er:

- enhetstangenten gitt ved  $\hat{\mathbf{T}}(t) = \frac{\mathbf{v}(t)}{v(t)}$
- krumningen gitt ved  $\kappa(t) = \frac{|\hat{\mathbf{T}}'(t)|}{v(t)}$
- hvis  $\kappa(t) \neq 0$  så er enhetsnormalen gitt ved  $\hat{\mathbf{N}}(t) = \frac{\hat{\mathbf{T}}'(t)}{|\hat{\mathbf{T}}'(t)|}$



## Smygsirkel (Osculating circle)

*Smygsirkelen* til en kurve i et punkt er sirkelen som skjærer kurven i punktet og som har samme enhetstangent, enhetsnormal og krumning som kurven i punktet.



I  $\mathbb{R}^3$  ligger smygsirkelen i *smygplanet*, som spennes ut av  $\hat{\mathbf{T}}$  og  $\hat{\mathbf{N}}$ . Normalvektoren til smygplanet,  $\hat{\mathbf{B}} = \hat{\mathbf{T}} \times \hat{\mathbf{N}}$ , kalles *binormalen*.