

Anbefalte oppgaver uke 11

Våren 2021

De fleste av oppgavene er hentet fra læreboken Calculus 2, 9.utgave av Adams og Essex.

Oppgaver til plenumsregning

- 1] Finn den totale ladningen på flaten

$$\mathbf{r} = (e^u \cos v, e^u \sin v, u), \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi)$$

når ladningstettheten er gitt ved $\delta = \sqrt{1 + e^{2u}}$.

- 2] Finn fluksen til $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ ut gjennom kula $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

- 3] La \mathcal{S} være den delen av paraboloiden $z = 1 - x^2 - y^2$ som ligger over planet $2x + z = 1$. Vi orienterer \mathcal{S} ved å velge enhetsnormalen \mathbf{n} slik at den peker oppover (med andre ord: \mathbf{n} skal ha positiv z -komponent). Finn fluksen gjennom \mathcal{S} av vektorfeltet $\mathbf{F} = \mathbf{k}$, dvs. regn ut integralet

$$\iint_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma.$$

- 4] Finn en parametrisering av hyperboloiden

$$x^2 + y^2 - z^2 = 25.$$

- 5] La \mathbf{N} være den utadpekende enhetsnormalen til en glatt og orientert flate \mathcal{S} i rommet. Vis at fluksen til \mathbf{N} ut av \mathcal{S} er arealet av \mathcal{S} .

Oppgaver med løsningsforslag

- 15.5.2] Verifiser at flatelementet (arealelementet) dS til den sfæriske flaten $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ er gitt i sfæriske koordinater ved $dS = a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta$.

- 15.5.7] Finn $\iint_{\mathcal{S}} x \, dS$ over den delen av den paraboliske sylindringen $z = x^2/2$ som ligger inne i første oktant av sylindringen $x^2 + y^2 = 1$.

- 15.5.13] Finn $\iint_{\mathcal{S}} y \, dS$ der \mathcal{S} er den delen av planet $z = 1 + y$ som ligger inne i kjeglen $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$.

- 15.5.15] Finn $\iint_{\mathcal{S}} xz \, dS$ der \mathcal{S} er den delen av flaten $z = x^2$ som ligger i første oktant inne i paraboloiden $z = 1 - 3x^2 - y^2$.

- 15.6.1] Finn fluksen til $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + z\mathbf{j}$ ut av tetraederet begrenset av koordinatplanene og planet $x + 2y + 3z = 6$.

Eksamen V2004, Oppg. 3 La S være flaten bestemt ved

$$z = 2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \geq 0.$$

Skisser S , og beregn fluksen opp gjennom S av vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y^2)\mathbf{i} + (3x^2y + y^3 - x^3)\mathbf{j} + (z + 1)\mathbf{k}.$$

Eksamen S2009, Oppg. 4 La S være den delen av flaten

$$z = \ln(x^2 + y^2)$$

som ligger i første oktant, under planet $z = 2$.

Beregn arealet av S .