

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I SIF5005 MATEMATIKK 2
august 2001

Oppgave 1.

a)

$$\begin{aligned}f_x(x, y) = 3x^2y + y^2 = 0 &\Rightarrow y = 0 \text{ eller } y = -3x^2 \\f_y(x, y) = x^3 + 2xy + 40 = 0\end{aligned}$$

Tilfellet $y = 0$ gir $x^3 = -40$ slik at $(-\sqrt[3]{40}, 0) = (-2\sqrt[3]{5}, 0)$ er et kritisk punkt. Tilfellet $y = -3x^2$ gir at $x^3 - 6x^3 + 40 = 0$, det vil si, $x = 2$, slik at $(2, -12)$ er et kritisk punkt.

Flere kritiske punkt finnes ikke.

Klassifisering ved annenderiverttesten: Testfunksjonen

$$\Delta(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) = 6xy \cdot 2x - (3x^2 + 2y)^2$$

gir at $\Delta(-\sqrt[3]{40}, 0) < 0$ og $\Delta(2, -12) < 0$. Begge de kritiske punktene er derfor sadelpunkter.

b) $f(x, y)$ vokser med x og vokser med y i første kvadrant. Maksimum ligger derfor i punktet $(1, 1)$ der både x og y er størst, mens minimum ligger i $(0, 0)$ der både x og y er minst i området. Største verdi er derfor $f(1, 1) = 42$ og minste verdi er $f(0, 0) = 0$.

Oppgave 2. $\nabla f(a, b, c) = \langle 2a, 2b, 8c \rangle$. Tangentplanet er derfor

$$T: \quad 2a(x - a) + 2b(y - b) + 8c(z - c) = 0.$$

Punktet $(0, 0, 4)$ ligger i T hvis og bare hvis $-2a^2 - 2b^2 + 8c(4 - c) = 0$. I tillegg må $a^2 + b^2 + 4c^2 = 16$, siden punktet (a, b, c) ligger på ellipsoideflaten. Vi har altså ligningene

$$(1) \quad a^2 + b^2 + 4c^2 - 16c = 0$$

$$(2) \quad a^2 + b^2 + 4c^2 = 16$$

Subtraksjon viser at $16c = 16$, det vil si, $c = 1$. Innsatt i (2) gir det: $a^2 + b^2 = 12$. Med andre ord, kurven er en horisontal sirkel i høyde $z = 1$ med sentrum på z -aksen og radius $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Oppgave 3 Volumet til legemet er

$$V = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\varphi=0}^{\pi} \int_{\rho=0}^{2-\cos\varphi} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \int_0^{\pi} \frac{1}{3} (2 - \cos\varphi)^3 \sin\varphi \, d\varphi.$$

Substitusjonen $u = 2 - \cos\varphi$ gir

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_1^3 u^3 \, du = \frac{2\pi}{3} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^3 = \frac{40\pi}{3}$$

1

Oppgave 4

$$I = \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{z-4} dy dz dx = \int_0^2 \int_0^{4-x^2} x \frac{\sin 2z}{z-4} dz dx = \iint_R x \frac{\sin 2z}{z-4} dA$$

der R er området i første kvadrant av xz -planet, avgrenset av koordinataksene og parabellen $z = 4 - x^2$. Vi bytter integrasjonsrekkefølgen og får

$$I = \int_{z=0}^4 \int_{x=0}^{\sqrt{4-z}} x \frac{\sin 2z}{z-4} dx dz = \int_0^4 -\frac{1}{2} \sin 2z dz = \left[\frac{\cos 2z}{4} \right]_0^4 = \frac{1}{4}(\cos 8 - 1).$$

Oppgave 5 $f(x, y)$ er ikke kontinuerlig i origo fordi

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \neq f(0, 0) = 0.$$

(Dette kan også vises ved å se at $\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ er avhengig av θ , slik at $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ ikke eksisterer.)

Ved definisjonen av de partiell deriverte gjelder

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 \cdot x} \text{ eksisterer ikke.}$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Oppgave 6

a) $\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial(x^3 z)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3 z)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial z} = 3x^2 z + 3y^2 z = 3r^2 z$ i sylinderkoordinater.

Ved divergensteoremet har vi

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iiint_T 3r^2 z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-r^2}} 3r^2 z \cdot r dz dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 \left[3r^3(1-r^2) \cdot \frac{1}{2} \right] dr = \pi \left[\frac{3}{4}r^4 - \frac{1}{2}r^6 \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

b) Fluksen ut gjennom S_1 er lik fluksen ut gjennom hele S minus fluksen ut gjennom bunnen av halvkulen. Det vil si:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS - \iint_{\text{Bunn}} \vec{F}(x, y, 0) \cdot (-\vec{k}) dS \\ &= \frac{\pi}{4} - \int_0^{2\pi} \int_0^1 \langle 0, 0, r^2 \rangle \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle r dr d\theta = \frac{\pi}{4} + 2\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

Oppgave 7

$$\operatorname{curl} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z \cos x & z g(y) & f(x) + y^2 \end{vmatrix} = \langle 2y - g(y), -f'(x) + \cos x, 0 \rangle = \vec{0}$$

når $g(y) = 2y$ og $f'(x) = \cos x$, det vil si $f(x) = \sin x + C$. Videre skal $\int_{(0,0,0)}^{(0,0,2)} \vec{F} \cdot \vec{T} ds = 6$, der integralet er uavhengig av veivalg. Vi velger derfor å bruke det vertikale linjestykket $x = 0$, $y = 0$, $z = t$ for $0 \leq t \leq 2$ som vei. Det gir

$$\int_{(0,0,0)}^{(0,0,2)} \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \int_0^2 \langle z, 0, C \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dt = 2C = 6.$$

Det vil si, $C = 6$, og de søkte funksjonene er $g(y) = 2y$ og $f(x) = \sin x + 3$.

Oppgave 8 Projeksjonen av C ned i xy -planet er gitt ved

$$x^2 + 2x + y^2 - 3 = 2x - 2, \quad \text{det vil si, } x^2 + y^2 = 1$$

som er en sirkel med sentrum i origo og radius 1. Parametriseringen

$$C: \quad x = \cos \theta, \quad y = \sin \theta, \quad z = 2 - 2x = 2 - 2 \cos \theta \quad \text{for } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

av C gir C retning mot klokken sett ovenfra, og

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{F} \cdot \vec{T} ds &= \oint_C yz dx - (xz + 3x^2)dy + 0 dz \\ &= \int_0^{2\pi} \{\sin \theta(2 - 2 \cos \theta)(-\sin \theta) - (\cos \theta(2 - 2 \cos \theta) + 3 \cos^2 \theta) \cos \theta\} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \{-2 \sin^2 \theta + 2 \sin^2 \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta + 2 \cos^3 \theta - 3 \cos^3 \theta\} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (-2 + 2 \cos \theta - 3 \cos^3 \theta) d\theta = \int_0^{2\pi} (-2) d\theta = -4\pi. \end{aligned}$$

Vi må da velge enhetsnormalen \vec{n} til S med positiv \vec{k} -komponent. Det vil si,

$$\vec{n} = \frac{\nabla(x^2 + 2x + y^2 + z)}{|\nabla(x^2 + 2x + y^2 + z)|} = \frac{\langle 2x + 2, 2y, 1 \rangle}{\sqrt{(2x + 2)^2 + (2y)^2 + 1}}.$$

Videre er

$$\text{curl } \vec{F}(x, y, z) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & -xz - 3x^2 & 0 \end{vmatrix} = \langle x, y, -6x - 2z \rangle$$

og derved $\text{curl } \vec{F} \cdot \langle 2x + 2, 2y, 1 \rangle = 4x^2 + 4y^2 - 6 = 4r^2 - 6$ i polarkoordinater. Projeksjonen R av S ned i xy -planet er lik sirkelskiven med sentrum i origo og radius 1. Derved har vi

$$\begin{aligned} &\iint_S (\text{curl } \vec{F}) \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_R (4r^2 - 6) \frac{1}{\sqrt{(2x + 2)^2 + (2y)^2 + 1}} \cdot \sqrt{1 + (-2x - 2)^2 + (-2y)^2} dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r^2 - 6)r dr d\theta = -4\pi. \end{aligned}$$