

SIF5005 Matematikk 2, 9. august 2003

Løsningsforslag

Oppgave 1


- a) Kurven er en spiral som ligger på sylinderen med ligning $x^2 + y^2 = 1$. Spiralen gjør to omdreininger om sylinderen (vinkelen $2t$ vokser fra 0 til 4π) og strekker seg i lengden 2π langs sylinderen (fra $z = 0$ til $z = 2\pi$).

Figuren viser kurven sammen med sylinderen den ligger på.

Hastighetsvektoren er $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -2\sin(2t)\mathbf{i} + 2\cos(2t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Farten (lengden av hastighetsvektoren) er $|\mathbf{v}| = \sqrt{5}$, altså konstant. Derivasjon av ligningen $|\mathbf{v}|^2 = 5$ gir $2\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$, der $\mathbf{a} = \mathbf{v}'$ er akselerasjonsvektoren. Altså er akselerasjonsvektoren normalt på hastighetsvektoren. (Dette kunne vi selvsagt også sett ved å regne ut \mathbf{a} og beregne prikkproduktet.)

- b) Om kurven hadde vært en sirkel på tvers av aksens retning i sylinderen, ville krumningsradien vært 1. Siden den ligger på skrå, må krumningsradien være større.

Vi kan selvsagt også regne ut dette: Bruk formelen for dekomponering av akselerasjonsvektoren fra formellisten. I dette tilfellet er $v^2(t) = 5$ og $v'(t) = 0$. Spesielt, siden $|\mathbf{N}(t)| = 1$ kan vi ta lengden av hver side i formelen og få $|\mathbf{a}(t)| = 5\kappa(t)$. Direkte utregning gir $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = -4\cos(2t)\mathbf{i} - 4\sin(2t)\mathbf{j}$, så $|\mathbf{a}(t)| = 4$. Dermed blir $\kappa(t) = 4/5$, og krumningsradien i ethvert punkt på kurven blir $1/\kappa(t) = 5/4 > 1$.



Oppgave 2

Nivåkurver	Gradientfelt	Funksjonsuttrykk
I	B	X
II	C	X
III	X	f
IV	A	g

Oppgave 3

Utrekning viser at $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, og siden \mathbf{F} er definert overalt følger at vektorfeltet er konservativt. (Vi kunne godt hoppe over dette argumentet, siden utregningen nedenfor viser det samme.)

Den søkte funksjonen f må oppfylle $\nabla f = \mathbf{F}$, altså

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 3.$$

Dette gir

$$f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + c_1(y, z), \quad f(x, y, z) = \frac{1}{2}y^2 + c_2(x, z), \quad f(x, y, z) = 3z + c_3(x, y)$$

for funksjoner (“integrasjonskonstanter”) c_1 , c_2 og c_3 . Vi ser at

$$f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + 3z$$

oppfyller disse ligningene. Funksjonen oppfyller også $f(0, 0, 0) = 0$, og må derfor være den søkte funksjonen. (Med bokstavvalget i oppgaven skulle vi kanskje skrive dette $f(a, b, c) = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2 + 3c$.) Spesielt er $f(1, 0, 1) = 3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

Direkte utregning viser at $\nabla f = \mathbf{F}$, så \mathbf{F} er et konservativt vektorfelt. Som antydnet ovenfor hadde vi altså ikke trengt å regne ut at $\text{curl } \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

Oppgave 4

a) Direkte utregning (med litt forenkling underveis, ikke vist her) gir

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \mathbf{i} + \frac{v}{u^2 + v^2} \mathbf{k}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \mathbf{j} - \frac{u}{u^2 + v^2} \mathbf{k}, \quad \mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = -\frac{v}{u^2 + v^2} \mathbf{i} + \frac{u}{u^2 + v^2} \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Videre blir

$$|\mathbf{N}|^2 = \frac{v^2}{(u^2 + v^2)^2} + \frac{u^2}{(u^2 + v^2)^2} + 1 = \frac{1}{u^2 + v^2} + 1 = \frac{1 + u^2 + v^2}{u^2 + v^2},$$

slik at arealet av S blir

$$\begin{aligned} \text{areal}(S) &= \iint_{u^2+v^2 \leq 9} |\mathbf{N}(u, v)| \, du \, dv = \iint_{u^2+v^2 \leq 9} \sqrt{\frac{1 + u^2 + v^2}{u^2 + v^2}} \, du \, dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \sqrt{\frac{1 + r^2}{r^2}} r \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^3 \sqrt{1 + r^2} \, dr \\ &= 2\pi \left[\frac{1}{2}x\sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \right]_0^3 = \pi(3\sqrt{10} + \ln(3 + \sqrt{10})). \end{aligned}$$

b) Punktet $(\sqrt{3}, 1, \frac{1}{3}\pi)$ er $\mathbf{r}(\sqrt{3}, 1)$. En normalvektor i dette punktet er

$$\mathbf{N}(\sqrt{3}, 1) = -\frac{1}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{4}\sqrt{3}\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

En ligning for tangentplanet i dette punktet blir da

$$-\frac{1}{4}(x - \sqrt{3}) + \frac{1}{4}\sqrt{3}(y - 1) + (z - \frac{1}{3}\pi) = 0,$$

som det kanskje passer å skrive som

$$-x + \sqrt{3}y + 4z = \frac{4}{3}\pi.$$

Oppgave 5

Ved kjerneregelen blir den tidsderiverte av valutakursen

$$\frac{d}{dt}f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} = -\frac{1}{x^2y} \frac{dx}{dt} + \left(-\frac{1}{xy^2} + \frac{1}{z}\right) \frac{dy}{dt} + \left(-\frac{y}{z^2} + \frac{1}{z}\right) \frac{dz}{dt}.$$

Vi setter inn de gitte tallene, og får

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= -\frac{1}{200^2 \cdot 100} \cdot 1 + \left(-\frac{1}{200 \cdot 100^2} + \frac{1}{400}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{100}{400^2} + \frac{1}{400}\right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4000000} + \frac{1}{4000000} - \frac{1}{800} - \frac{1}{3200} + \frac{1}{800} = -\frac{1}{3200} < 0, \end{aligned}$$

så valutakursen avtar i øyeblikket.

Oppgave 6

Vi starter med å bestemme skjæringskurven mellom de to flatene S_1 og S_2 . På skjæringskurven er $x^2 + 3y^2 = 9 - 3x^2 - y^2$, altså $4x^2 + 4y^2 = 9$. Projeksjonen av skjæringskurven i xy -planet er altså sirkelen med sentrum i origo og radius $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$. Projeksjonen av T blir den tilhørende sirkelskiven. Nedenfor kaller vi denne sirkelskiven R .

a) Massen av T blir

$$\begin{aligned} m &= \iiint_T \delta(x, y, z) dV = \iint_R \int_{x^2+3y^2}^{9-3x^2-y^2} x^2 dz dA = \iint_R (9 - 4x^2 - 4y^2)x^2 dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{3/2} (9 - 4r^2)r^2 \cos^2 \theta \cdot r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \cdot \int_0^{3/2} (9r^3 - 4r^5) dr \\ &= \pi \left[\frac{9}{4}r^4 - \frac{4}{6}r^6 \right]_0^{3/2} = \frac{3^5}{2^6}\pi = \frac{243}{64}\pi. \end{aligned}$$

- b) Ettersom D_1 og D_2 tilsammen utgjør hele overflaten til T , kan divergensteoremet skrives

$$\iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_{D_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS + \iint_{D_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

Vi finner $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^2$, så integralet på venstre side blir $3m$, og dermed er

$$\iint_{D_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 3 \cdot \frac{243 \pi}{64} - \frac{2187 \pi}{256} = \frac{729 \pi}{256}.$$

- c) Vi kan bruke Stokes' teorem på D_2 (vi kunne like gjerne brukt D_1):

Utrekning gir $\operatorname{curl} \mathbf{F} = -3\mathbf{i}$, og om vi parametriserer D_2 med $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ der $(x, y) \in R$ og $z = 9 - 3x^2 - y^2$ blir

$$\mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = -\frac{\partial z}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k} = 6x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k},$$

så

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \iint_{D_2} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_R (-3\mathbf{i}) \cdot (6x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + \mathbf{k}) dA = -18 \iint_R x dA = 0$$

siden R er symmetrisk om y -aksen.

Vi kunne faktisk sett dette enda tidligere: $\operatorname{curl} \mathbf{F} = -3\mathbf{i}$ sammen med symmetrien av D_2 om yz -planet er tilstrekkelig til å se at integralet må bli null.

Alternativt kunne vi parametrisert C ved

$$x = \frac{3}{2} \cos t, \quad y = \frac{3}{2} \sin t, \quad z = x^2 + 3y^2 = \frac{9}{4} \cos^2 t + \frac{27}{4} \sin^2 t$$

som gir

$$dx = -\frac{3}{2} \sin t dt, \quad dy = \frac{3}{2} \cos t dt, \quad dz = 9 \sin t \cos t dt$$

og dermed

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_0^{2\pi} \left(\frac{27}{8} \cos^3 t \mathbf{i} + (9 \cos^2 t + 27 \sin^2 t) \mathbf{j} + \frac{3}{2} \sin t \right) \cdot \left(-\frac{3}{2} \sin t \mathbf{i} + \frac{3}{2} \cos t \mathbf{j} + 9 \sin t \cos t \mathbf{k} \right) dt$$

som blir null fordi alle produktene i skalarproduktet involverer en odde potens av enten $\cos t$ eller $\sin t$. (Om du ikke er kjent med dette symmetriargumentet, er det en overkommelig oppgave, om enn noe arbeidskrevende, å regne ut alle integralene og få null i hvert tilfelle.)