

Faglig kontakt under eksamen:

Kari Hag 73 59 35 21

Per Hag 73 59 17 43



Bokmål

EKSAMEN I SIF5005 MATEMATIKK 2

Torsdag 1. august 2002

Kl. 9–14

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP 30S)

Rottman: *Matematisk formelsamling*

Vedlegg: Formelliste

Sensurdato: 2. september

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1

Finn en normalvektor for hver av flatene

$$z = x^2 - y^2 \quad \text{og} \quad xyz + 30 = 0$$

i punktet $P(-3, 2, 5)$.

Bestem også en tangentvektor til skjæringskurven mellom de to flatene i punktet P .

Oppgave 2


En flat metallplate ligger i xy -planet og dekker området der $0 \leq x \leq 5$ og $0 \leq y \leq 5$. Temperaturen i punktet (x, y) er gitt ved

$$T(x, y) = 12 + 16x + 18y - 2x^2 - 2xy - 3y^2.$$

Figuren til høyre viser nivåkurver (isotermer) for temperaturfunksjonen T .

- Finn (ved partiellderivasjon) det kritiske punktet til T , og bestem den høyeste og den laveste temperaturen på metallplaten.
- Bestem den høyeste temperaturen i punktene som ligger på den rette linjen

$$2x + y = 4.$$



- c) La P være punktet med koordinater $x = 1$, $y = 1$. Hva er den retningsderiverte for temperaturen T i punktet P i retning mot punktet $(3, 2)$? I hvilken retning har T størst retningsderivert i punktet P ?


Anta nå at temperaturen i punktet (x, y) er gitt ved en uspesifisert funksjon $g(x, y)$. Du får oppgitt at den maksimale retningsderiverte for g i $P(1, 1)$ er lik 5 og oppnås i retning mot punktet $(3, 2)$. Hva er da den retningsderiverte for g i P i retning mot punktet $(2, 3)$?

Oppgave 3

Bytt integrasjonsrekkefølgen i trippelintegralet

$$\int_0^1 \int_0^x \int_0^{\sqrt{xy}} f(x, y, z) dz dy dx$$

til $dy dx dz$. (Figuren til høyre viser integrasjonsområdet for trippelintegralet.)



Oppgave 4

La C være kurven med parameterfremstilling

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t/2, \quad 0 \leq t \leq 4\pi.$$

- a) Gjør rede for at C ligger på en sylinderflate og skisser C . Finn lengden av C .
- b) La \mathbf{F} være vektorfeltet gitt ved

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}.$$

Finn $\text{curl } \mathbf{F}$. Er \mathbf{F} et konservativt vektorfelt?

Beregn linjeintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

der C er kurven gitt ovenfor.

Oppgave 5

La T være legemet begrenset av flatene

$$z = 2x^2 + y^2 \quad \text{og} \quad z = 2x + x^2.$$

- a) Vis at projeksjonen av T ned i xy -planet er en sirkelskive med senter i $(1, 0)$ og radius 1.

Bestem volumet av T .

(Oppgitt formel: $\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$.)

La \mathbf{F} være vektorfeltet gitt ved

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 2x + x^2 - z, -2xy, z - x^2 \rangle.$$

- b) Finn verdien av flateintegralet

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

der S er hele overflaten av T og \mathbf{n} er utadrettet enhetsnormal.

- c) Finn verdien av flateintegralet

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

der S_1 er den delen av overflaten av T der $z = 2x^2 + y^2$, og enhetsnormalen \mathbf{n} for S_1 har negativ \mathbf{k} -komponent.

Oppgave 6

Finn punktene (x, y) der $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ og $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ for en funksjon $z = f(x, y)$ som oppfyller ligningen

$$e^{2zx-x^2} - 3e^{2zy+y^2} = 2.$$

FORMELLISTE

Annenderiverttesten:

$$\Delta = AC - B^2 \quad \text{der} \quad A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}$$

Koordinatsystemer:

$$\begin{aligned} \text{Sylinderkoordinater} \quad x &= r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \\ r^2 &= x^2 + y^2, \quad dV = r \, dz \, dr \, d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kulekoordinater} \quad x &= \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \\ \rho^2 &= x^2 + y^2 + z^2, \quad dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta \end{aligned}$$

Flateintegral:

$$dS = |\mathbf{N}(u, v)| \, du \, dv = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| \, du \, dv$$

Tyngdepunkt for romlige legemer:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_T x \, dm, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iiint_T y \, dm, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iiint_T z \, dm, \quad dm = \delta \, dV$$

Vektoranalyse:

$$\text{Greens teorem:} \quad \oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dA$$

$$\text{Divergensteoremet:} \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \iiint_T \text{div } \mathbf{F} \, dV$$

$$\text{Stokes' teorem:} \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S (\text{curl } \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$$

$$\text{der } \nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$$