



NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

# Laplacetransformasjoner og Kompleks analyse

Førebuande kurs

Erling Svela  
August 2023

# Plan måndag 07.08

**Informasjon**

Komplekse tal

## Målet med kurset

- ▶ Målet er å gjennomgå tema frå matematikken som blir rekna som kjent i ingeniørkursa.
- ▶ Kurset er todelt.
- ▶ Ved slutten av kurset skal de ha grunnleggjande kunnskap om komplekse tal, komplekse funksjonar og laplacetransformasjonar.
- ▶ Kurset er frivillig og utan eksamen (men eg tilrår alle å ta det).

# Informasjon

- ▶ Kurset går over to veker, med kurstid 13.15-16.00 kvar dag (unntatt måndag 14/08).
- ▶ Nettside: <https://wiki.math.ntnu.no/tma4120/2023h/forkurs/start>.
- ▶ E-post: [erling.a.t.svela@ntnu.no](mailto:erling.a.t.svela@ntnu.no). Kontor: Rom 922, 9.etasje i sentralbygg 2.

## Kven er de?

- ▶ Studentar ved eit toårig ingeniørprogram.
- ▶ Ulik bakgrunn, både geografisk og fagleg.
- ▶ Nivået på kurset skal passe alle.

# Kursform

- ▶ Førelsing og oppgaver.
- ▶ Fokuset er på metoder, og på matematiske problem.
- ▶ Sjekk boka "Reguleringsteknikk" på wiki-sida dersom de ønsker problem frå ingeniørvitskapen.

# Faglege mål

Ved slutten av kurset skal de ha lært å:

- ▶ Rekne med komplekse tal, forstå polarforma, og løyse viktige likninger ved hjelp av komplekse tal.
- ▶ Laplacetransformere vanlege funksjonar, og bruke laplacetransformasjon til å løyse differensiallikninger av varierende vanskegrad.

# Plan måndag 07.08

Informasjon

**Komplekse tal**



# Andregradslikninger og $i$

- ▶ Løysinga på  $ax^2 + bx + c = 0$  er  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ .
- ▶ Ok, men kva med  $x^2 + 1 = 0$ ?

## Talet $i$

Talet  $i$  er løysinga til  $x^2 + 1 = 0$ ,  $i$  har altså eigenskapen  $i^2 = -1$ .

# Komplekse tal

## Komplekse tal

Eit komplekst tal  $z$  er eit uttrykk på forma  $z = a + bi$  for  $a$  og  $b$  i  $\mathbb{R}$ .

- ▶  $a$  vert kalla realdelen til  $z$  og  $b$  vert kalla imaginærdelen til  $z$ . Vi skriv  $a = \operatorname{Re}(z)$ ,  $b = \operatorname{Im}(z)$ .
- ▶ Vi bruker teiknet  $\mathbb{C}$  som symbol for dei komplekse tala.

# Reknereglar for komplekse tal

- ▶ Rekning med komplekse tal blir gjort med vanlege reknereglar, samt at vi bruker at  $i^2 = -1$ .
- ▶ Døme: Rekn ut  $(3 + i) + 4i$ . Rekn ut  $(1 + i) \cdot (2 + \pi i)$ , Rekn ut  $\frac{1}{1+i}$ .

Reknereglar:

- ▶  $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- ▶  $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- ▶  $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bd)i$
- ▶  $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$
- ▶  $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$ .

# Konjugering

- ▶ Den ekstra strukturen til komplekse tal gjev rom for fleire operasjonar.
- ▶ Konjugasjon:  $\overline{a + bi} = a - bi$ .
- ▶ Merk:  $z\bar{z}$  har imaginærdel 0.
- ▶ Samspel mellom konjugasjon og aritmetikk:  
 $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ ,  $\overline{z - w} = \bar{z} - \bar{w}$ ,  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ ,  $\overline{\frac{z}{w}} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$ .
- ▶ Merk:  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}}$ .