

Norges
teknisk–naturvitenskapelige
universitet
Institutt for matematiske fag

TMA4125
Matematikk 4D
Høst 2011

Øving 13

Kun de med for få godkjente øvinger kan levere øving 13. Mangler du én øving må du forsøke å besvare *minst* halvparten av oppgavene. Mangler du to øvinger må du forsøke å besvare *alle* oppgavene.

Øvingene leveres i posthylla til Dag Wessel Berg på Instituttkontoret i 7.etasje, Sentralbygg 2, innen ordinær frist uka etter at øving 12 skal inn.

Alle oppfordres til å regne gjennom øvingen, da alle øvingene er pensum.

1 Oppgave 2 gitt til øving 11 i TMA4122 Matematikk 4M, høsten 2009

La $y = y(x)$ være funksjonen som tilfredsstiller den andre ordens differensialligningen

$$y'' - (1 - y^2)y' + y = 0 \quad (*)$$

med startbetingelser $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$.

- a) Skriv om ligning (*) til et system av første ordens differensialligninger. Hva blir startverdiene for dette systemet?

Vi ønsker å løse systemet av differensialligninger

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0$$

numerisk. Vi har, blant andre metoder, studert Eulers metode for denne typen ligninger. Et alternativ, kjent som «baklengs Euler» er gitt ved

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(x_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}), \quad (**)$$

der h er skrittlengden og $x_{n+1} = x_n + h$. Vi antar at \mathbf{y}_n er kjent, og (**) brukes for å finne tilnærmelsen \mathbf{y}_{n+1} . Metoden er *implisitt* siden funksjonen \mathbf{f} beregnes i den ukjente løsningen \mathbf{y}_{n+1} . Vi finner denne ved å løse et ikke-lineært ligningssystem.

- b) La $h = 0,1$, og sett opp det ikke-lineære ligningssystemet du får når du ønsker å utføre et skritt med baklengs Euler på systemet du fant i oppgave a).

c) Gjør en iterasjon med Newtons metode på ligningssystemet

$$\begin{aligned} 10y_1 - y_2 - 20 &= 0 \\ y_1 + (9 + y_1^2)y_2 &= 0. \end{aligned}$$

Bruk $y_1 = 2$ og $y_2 = 0$ som startverdier for iterasjonen.

2] Oppgave 5 gitt til eksamen i TMA4135 Matematikk 4D, høsten 2006


I et anisotrop materiale, der varmekonduktiviteten i y -retningen er to ganger høyere enn i x -retningen, tar den stasjonære diffusjonsligningen (varmeligningen) formen

$$u_{xx} + 2u_{yy} = 0. \quad (*)$$

Vi vil løse (*) numerisk. Området er et kvadrat med sidelengde 1 og randbetingelser gitt ved

$$\begin{aligned} u(x, 0) = u(0, y) &= 0 \\ u(x, 1) = u(1, y) &= 1, \end{aligned}$$

for $x, y \in [0, 1]$. Vi betrakter det følgende gitteret



der $h = 1/3$ og $U_{i,j} \approx u(ih, jh)$.

a) Vis at differenseskjemaet som tilsvarende (*) er

$$U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + 2U_{i,j+1} + 2U_{i,j-1} - 6U_{i,j} = 0.$$

b) Sett opp systemet som $U_{i,j}$ ($i, j = 1, 2$) tilfredstiller og gjør en iterasjon med Gauss-Seidel med startpunktet $U_{1,1}^{(0)} = U_{2,1}^{(0)} = U_{1,2}^{(0)} = U_{2,2}^{(0)} = 1/2$.

3] Oppgave 5 gitt til eksamen i TMA4135 Matematikk 4D, høsten 2005


Gitt Poisson-ligningen

$$u_{xx} + u_{yy} = -1$$

i et område R , gitt ved

$$R = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1 - x\},$$

og med $u(x, y) = 1$ på randen av R , se figuren under.



La $u_{ij} \approx u(x_i, y_j)$, med $x_i = ih$ og $y_j = jh$. Bruk skrittlengde $h = 0,25$ i både x - og y -retning og sett opp differanseligningene for u_{ij} i hvert av de indre punktene.

Finn u_{11} , u_{12} og u_{21} .

4 Oppgave 7 gitt til eksamen i TMA4135 Matematikk 4D, høsten 2007

Gitt problemet

$$(*) \quad \begin{cases} u_t = u_{xx} + u_x & (t > 0, 0 < x < 1) \\ u(0, t) = u(1, t) = t & (t \geq 0) \\ u(x, 0) = 8x(1 - x) & (0 \leq x \leq 1). \end{cases}$$

a) Sett opp et *eksplisitt* differanseskjema for (*) (tilsvarende ligning (4) side 923 i boken, men ta hensyn til det ekstra leddet u_x).

La $h = 1/4$, $k = 1/16$ og finn tilnærmelser til $u(1/4, 1/16)$, $u(1/2, 1/16)$ og $u(3/4, 1/16)$.

b) Modifiser Crank–Nicolsons metode (ligning (7) side 924 i boken) slik at du kan bruke den til å løse (*). Velg h og k som i oppgave a), og sett opp det lineære ligningssystemet som må løses for første skritt.

c) Utfør to Gauss–Seidel iterasjoner på ligningssystemet fra oppgave b). Bruk initialverdiene $u(ih, 0)$, $i = 1, 2, 3$ som startverdi på iterasjonene.

5 Oppgave 5 gitt til eksamen i TMA4135 Matematikk 4D, høsten 2008

a) Vi vil løse ligningen

$$u_{xx} + u_{yy} = 27(x + y),$$

på enhetskvadratet $[0, 1] \times [0, 1]$ med randbetingelser

$$u(0, y) = u(x, 0) = 0, \quad u(x, 1) = 3x, \quad u(1, y) = 3y.$$

Finn en tilnærming til løsningen $u(x, y)$ ved å bruke sentraldifferanser for å approkimere u_{xx} og u_{yy} . La $h = 1/3$ være skrittlengden, og la gitteret være gitt av punktene $(x_i, y_j) = (ih, jh)$ for $i, j = 0, \dots, 3$. Sett opp et system av ligninger for $U_{1,1}, U_{2,1}, U_{1,2}$ og $U_{2,2}$, der $U_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$.

- b) Utfør én Gauss–Seidel iterasjon på systemet du fikk i oppgave a). Bruk som startvektor $\mathbf{x}_0 = -(1, 1, 1, 1)$.

- 6] Løs initialverdiproblemet

$$f'(t) = e^{2t} \sin t + \int_0^t e^{2u} (\cos u + 2 \sin u) f(t-u) du, \quad t \geq 0,$$

$$f(0) = 0,$$

ved hjelp av Laplace-transformasjon.

- 7] La $0 < a < \pi$ og la $f(x)$ være en jevn funksjon med periode 2π som oppfyller

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ 0 & \text{for } a < x \leq \pi. \end{cases}$$

- a) Vis at Fourier-rekken til $f(x)$ er

$$\frac{a}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n} \cos nx.$$

- b) Finn summen av rekkene

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n}, \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2na}{2n}.$$

- 8] a) La $f(x)$ være funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} 2 - |x| & \text{for } -2 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases}$$

Finn den Fourier-transformerte til $f(x)$.

- b) Bruk resultatet fra oppgave a) til å beregne

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 w}{w^2} dw.$$

9] Gitt følgende partielle differensialligning

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t \geq 0,$$

med randkravene

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} u_x(x, t) = 0.$$

Vis at en løsning som oppfyller initialbetingelsen

$$u(x, 0) = 0,$$

er gitt på formen

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-\frac{w^2}{4}} g(w, t) \cos wx \, dw.$$

Funksjonen $g(w, t)$ skal bestemmes.