



# Simultanfordeling

Torstein Fjeldstad

Institutt for matematiske fag, NTNU

24.01.2019

# I dag

- Simultanfordeling
- Kahoot



# Repetisjon I



## Stokastisk variabel (def. 3.1)

Ein **stokastisk variabel**  $X$  er ein funksjon som assosierar eit reellt tal med kvart element i utfallsrommet  $S$ , dvs.  $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ .

## Notasjon

- $X, Y$ : store bokstavar for stokastiske variable
- $x, y$ : små bokstavar for utfall (datapunkt/målingar)

# Repetisjon II



## Sannsynsfordeling

Diskret	Kontinuerleg
$f(x) \geq 0$ for alle $x$	$f(x) \geq 0$ for alle $x$
$\sum_x f(x) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
$P(X = x) = f(x)$	$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$

# Repetisjon III



## Kontinuerleg kumulativ fordeling

Den kumulative fordelinga til ein stokastisk variabel  $X$  er:

Diskret :  $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$  for  $-\infty < x < \infty$

Kontinuerleg :  $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$  for  $-\infty < x < \infty$



## Egenskapar kontinunerleg kumulativ fordeling

- $0 \leq F(x) \leq 1$  (merk  $f(x)$  kan vere større enn 1)
- $F(x)$  er ikkje-avtakande og kontinuerleg
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  og  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- $f(x) = F'(x)$



# Simultanfordeling (kap. 3.4)

# Simultanfordeling

## Diskret

Funksjonen  $f(x, y)$  er ein simultan sannsynstettleik for dei diskrete stokastiske variablane  $X$  og  $Y$  dersom

1.  $f(x, y) \geq 0$  for alle  $(x, y)$
2.  $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$
3.  $P(X = x, Y = y) = f(x, y)$

# Simultanfordeling

## Diskret

Funksjonen  $f(x, y)$  er ein simultan sannsynstettleik for dei diskrete stokastiske variablane  $X$  og  $Y$  dersom

1.  $f(x, y) \geq 0$  for alle  $(x, y)$
2.  $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$
3.  $P(X = x, Y = y) = f(x, y)$

## Kontinuerleg

Funksjonen  $f(x, y)$  er ein simultan sannsynstettleik for dei kontinuerlege stokastiske variablane  $X$  og  $Y$  dersom

1.  $f(x, y) \geq 0$  for alle  $(x, y)$
2.  $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$
3.  $P((X, Y) \in A) = \int \int_A f(x, y) dx dy$  for alle  $A$  i  $xy$ -planet



# Døme



Anta at du har ei urne med 12 kuler. Av desse er 3 røde, 4 gule og 5 blå. Trekk 3 av desse, uten tilbakelegging. La

$X$  = talet på røde kuler du trekk

$Y$  = talet på gule kuler du trekk

Finn simultanfordelinga til  $X$  og  $Y$ ,  $P(X = x \cap Y = y) = f(x, y)$ .



$y \setminus x$	0	1	2	3	
0	0.0455	0.136	0.068	0.0045	
1	0.182	0.273	0.0545	0	
2	0.136	0.082	0	0	
3	0.0182	0	0	0	
					1

$y \setminus x$	0	1	2	3	$h(y)$
0	0.0455	0.136	0.068	0.0045	0.245
1	0.182	0.273	0.0545	0	0.5095
2	0.136	0.082	0	0	0.218
3	0.0182	0	0	0	0.0182
$g(x)$	0.382	0.491	0.123	0.0045	1

# Marginalfordeling

## Marginalfordeling

Marginalfordelinga til  $X$  og  $Y$  er høvevis

$$g(x) = \sum_y f(x, y) \quad \text{og} \quad h(y) = \sum_x f(x, y)$$

i diskret tilfelle, og

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad \text{og} \quad h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

i kontinuerleg tilfelle.

# Betinga fordeling

## Betinga fordeling

La  $X$  og  $Y$  vere stokastiske variable (diskrete eller kontinuerlege). Den betinga fordelinga til  $Y$  gjeve  $X = x$  er

$$f(y|x) = \frac{f(x,y)}{g(x)} \quad ; \quad g(x) > 0$$

# Uavhengighet



## Uavhengighet

To stokastiske variable  $X$  og  $Y$  er uavhengige viss og berre viss

$$f(x, y) = g(x)h(y) \quad \text{for alle } (x, y).$$

## Neste veke



- Forventningsverdi og varians (kap. 4)